آواستین چیست؟

آواستین یکی از داروهایی است که به شکل تزریق داخل چشمی در چند سال اخیر استفاده می‌شود. این دارو به چشم تزریق می‌شود تا از کاهش‌دید بیمار جلوگیری کند. این دارو در انواع اختلالات و بیماری‌های شبکیه شامل : دژنرسانس ماکولا و بیماری‌هایی مانند رتینوپاتی دیابتی، یووئیت، خونریزی زجاجیه، انسداد وریدهای شبکیه، ایجاد عروق خونی نا به جا در مشیمیه و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مراقبتهای قبل از تزریق آواستین

چندین کار برای قبل از تزریق باید مد نظر قرار گیرد:
۱- بهداشت عمومی و شستشوی سر و صورت و حمام کردن (چون تا دو روز بعد نباید آب به چشم برسد)
۲- استفاده از قطره‌های تجویز شده توسط پزشک
۳- عدم آرایش چشم در بانوان (که تا ۳ روز بعد از تزریق منع مصرف دارد)
۴- گزارش هرگونه وضعیت مشکوک مانند درد، قرمزی و ترشح چرکی در روز تزریق (درصورتی که قبلاً وجود نداشته)
۵- به همراه داشتن مدارک و برگه‌ها و عکس‌ها
۶- نیاز به قطع داروهای قبلی نیست.

در حین تزریق آواستین چه اتفاقی می‌افتد؟

چشم پزشک آواستین را در یک عمل سرپایی به داخل چشم تزریق می‌کند. قبل از عمل چشم‌پزشک چشم‌ها را برای جلوگیری از عفونت تمیز می‌کند و از یک قطره بی‌حسی برای چشم استفاده می‌نماید.
سپس دارو از قسمت سفیدی چشم توسط یک سوزن بسیار نازک به داخل چشم تزریق می‌شود. عموماً خود سوزن توسط بیمار دیده نمی‌شود. بیماران ممکن است چندین تزریق آواستین را طی دوره‌های چند ماهه دریافت کنند. اغلب تکرار تزریق جهت دست‌یابی به نتایج بهتر نیاز است.
گاهی اوقات، چشم‌پزشک انجام سایر روش‌های درمانی را با توجه به موقعیت بیمار همزمان با تزریق آواستین پیشنهاد می‌کند.



مراقبت‌های بعد از تزریق آواستین:

- در صورتی که دارویی قبلاً استفاده می‌کردید طبق روال قبلی استفاده کنید.
- قطره کلرامفنیکل را هر۶ ساعت تا ۳ روز ادامه دهید.
- ۲۴ ساعت از شستن چشم‌ها و استحمام خودداری نمائید.
- ۲ ساعت بعد از تزریق پانسمان برداشته شود.
- لطفا از مالیدن دستمال کاغذی بر روی چشم تزریق شده یا خاراندن آن تا۲۴ ساعت پس از تزریق خودداری نمائید.
- درصورت تاری دید از رانندگي اجتناب نمایید.
- توجه فرمائید که جهت نتیجه‌گیری بهتر، باید کنترل صحیحي روی فشار خون و قند خون داشته باشید.
- در نظر داشته باشید که پس از تزریق ممکن است عوارضی مانند اشك ریزش، قرمزی و سوزش چشم وجود داشته باشد.
- در صورت بروز علائمي مانند درد شدید، تهوع، استفراغ، کاهش دید، مگس‌پران شدید نسبت به ساعات ابتدایی پس از تزریق دیدن سایه و یا پرده در میدان بینایی، افزایش قرمزی و ترشحات غلیظ در اسرع وقت با پزشك خود تماس گرفته و در صورت عدم امکان تماس، جهت راهنمایی بیشتر با تلفن بیمارستان آفتاب به شماره ۱۴۲۱ یا ۰۹۹۱۵۳۳۳۴۸۷ تماس حاصل نمایید.
- در صورت نیاز به ویزیت اورژانسی از ساعت ۷ صبح الي ۱۹ در بیمارستان چشم آفتاب و از ساعت ۱۹ الي ۷ صبح روز بعد و روزهاي تعطیل می‌توانید به اورژانس بیمارستان چشم آفتاب مراجعه و معاینه چشم انجام دهید.
- براي تزریقات داخل چشمی نیاز به ناشتا بودن و قطع آسپرین و سایر داروهای قبلی نیست.

تهیه شده توسط: **انتشارات بیمارستان آفتاب**



آفتاب
بیمارستان چشم
AFTAB
EYE HOSPITAL

تهران ـ بزرگراه همت غرب ـ بعد از پل کن
۱۴۲۱
کدپستی : ۱۴۸۶۸۱۲۰۰۱
www.aftabhospital.com

آواستین
AVASTIN

آفتاب
بیمارستان چشم
AFTAB
EYE HOSPITAL

تهران ـ بزرگراه همت
غرب ـ بعد از پل کن
۱۴۲۱